

A jelenlegi tudásunk szerint a lázcsillapítás elsődleges célja a közérzet javítása. Akinek tehát hőemelkedése vagy láza van és fáj a feje, rosszul érzi magát, annak kell adni lázcsillapítót, amelyik gyerek viszont a láza ellenére nagyjából a szokásosan viselkedik, és nem panaszkodik fájdalomra, annak szükségtelen lázcsillapítót adni, mert előnye nincs belőle.

A bő folyadékbevitelre kifejezett hangsúlyt kell fektetni, mivel a láz növekedett folyadékvesztést okoz a szervezetben.



Lázmérés

Tekintse át a lázmérések eredményeinek értékeléséről szóló alábbi táblázatot és vezesse a rendszer naplójában a lázmenetet.

01

Naplózás

A tünetek és kezelések rögzítése sokat segít a gyermek állapotának.

02





Általános tanácsok követése

Olvassa el alábbi tanácsainkat!

03

	Hónaljban	Popsiban
Normális testhőmérséklet	36,0 - 37,0 °C	36,5 - 37,5 °C
Hőemelkedés	37,0 - 38,0 °C	37,5 - 38,5 °C
Láz	38,0 °C felett	38,5 °C felett



Azonnal keressék fel a legközelebbi gyermek sürgősségi osztályt

Amennyiben gyermeke 3 hónap alatti csecsemő és lázas (nem védőoltást követően), akkor azonnal keresse fel az Önhöz legközelebbi gyermekgyógyászati sürgősségi osztályt, mivel a csecsemőkre a betegségek veszélyesebbek!