

Véres széklet

Csecsemőkori friss piros vért tartalmazó székletnek (hematokézia) a sérülések az ánuszt körül, a fertőzések és a székrekedés utáni negyedik leggyakoribb oka az ételallergia. A leggyakrabban az anya által elfogyasztott tehéntejfehérje, ritkábban tojás, tej, dió- ésogyorófélék, szója, halfélék és búza okozza a tüneteket.

Az enyhe tünetek miatt anyai diéta válhat szükségessé, amire általában megszűnnek a tünetek, de csak több hét szigorú anyai diéta után.

Nagyobb gyermekekben jelentkező véres székletnél hasonló elv szerint kell átgondolni a kiváltó okok lehetőségét és a teendőket, amennyiben nem nagy mennyiségű vér vesztéséről beszélünk sürgősségi állapotot nem valószínűsíthetünk.



Vér mennyisége a székletben

Amennyiben a csecsemőnél kevés vér jelenik meg a székletben, aggodalomra nincs ok.

Csak abban az esetben van szükség sürgős kivizsgálásra, ha nagy mennyiségű vér (tenyérsnyi) ürül, a gyermek elesett, aluszékony, nem megnyugtatható.

Friss piros vagy emésztett vér?

01

Okok felderítése


Sok esetben alakul ki székrekedést vagy valamilyen fizikai behatást (pl lázmérőzés) követően a bőr felületi sérülése, amely avérzés forrása, ezért a fenék figyelmes áttekintése javasolt, seb, repedés felderítése érdekében.

Szoptatott csecsemők esetén az anyai mell sérülését is ki kell zárni.

Történt -e új allergén bevezetése vagy összeköthető -e étkezéssel.

Fertőzés lehetősége felmerül -e? Családban másnak tünete van?

02



Diéta

Szoptatott csecsemők esetén anyai diéta válhat szükségessé, amire általában megszűnnek a tünetek, de csak több hét szigorú anyaidiéta után.

Tápszeres babáknál szóba jöhet a tápszer leváltása

Nagyobb gyermek esetében szigorú diéta tartása válhat szükségessé.

03

Elhúzódozó panaszok

Széklet tenyésztés vizsgálat elvégzése szóba jön.

Gasztroenterológiai kivizsgálás válhat szükségessé a hetek óta, diéta ellenére nem szűnő véres széklet miatt

04

