

Vizelettel kapcsolatos eltérések

A vizelet közben jelentkező fájdalom, égő, csípő érzés leggyakoribb oka húgyúti fertőzés. Ilyen panasz jelentkezik akkor is, ha a nemi szervek gyulladtak. Ez legtöbb esetben szemmel látható, a nemi szervek pirosak, váladékosak (erre hajlamosíthat a lányoknál a kisajkak összenövése, fiúknál a fitymaszűkület, vagy letapadás). Közösségbe járó gyermekeknél gondolni kell bélférgességre is. Vesehomok, vesekő ürülése is állhat a háttérben. Ha a fájdalmas vizelet mellett sérülés nyomai is látszanak a gyermekén, akkor balesetre is gondolni kell.



Vizelési panasz

Szúró, bűzös, sötét vizelet vagy nagyon gyakori vizelési inger

Gyakran húgyúti fertőzés áll a háttérben, de nem mindig. Fontos a gyermek életkora.

01

Társuló tünet

Láz, lágyék-és/vagy deréktáji fájdalom, étvágytalanság

Nemi szervén bármilyen eltérés, pír (gyulladás)

02



Vizelet vizsgálat akár otthon

Patikában kapható vizelet gyorseszttel megfelelően levett mintából (fertőtlenített nemiszerv, ragasztott zacskó pelenkásoknál, idősebbeknél középsugaras vizelet) meg lehet állapítani, hogy a gyermek vizeletében van -e vér, fehérje vagy más eltérés.

Az eredményt orvossal konzultálva kell értékelni.

Szükségessé válhat laboratóriumban végezni vizelet vizsgálatokat pl. vizelet tenyésztés

03

Kezelés

Amíg orvosával konzultálni tud, addig is általános tanácsokat érdemes csinálni, kiemelten fontos a bő folyadékbevitel.

Húgyútat érintő betegségekben a tűzegáfonya kivonatok (pl. Walurinal italpor,) fogyasztását orvosaink javasolni szokták 2 éves kor felett.

Orvosi konzultációt követően más gyógyszert is javasolhat orvosa.

04



Húgyúti fertőzés

Ha egy kórokozó a húgyutakban gyulladást okoz, húgyúti fertőzés alakul ki. Felső húgyúti, azaz vesemedence-gyulladást és alsó húgyúti fertőzést, azaz hólyaghurutot különböztetünk meg. Többnyire bélből származó baktériumok okozzák, amik a húgycsőn át a hólyagba, esetleg a vesemedencébe jutnak. A vesemedence-gyulladás tünete csecsemőknél láz, étvágytalanság, gyermekeknél láz, esetleg hőemelkedés, deréktáji fájdalom. Hólyaghurut esetén a gyermek nem lázas, vizeletkor fájdalmat, csípő érzést, gyakori vizelési ingert jelezhet. A vizelet általában mindkét esetben bűzös, sötétebb. Ha a gyermek lázas, nem fogad el folyadékot, akkor kevesebb a vizelet mennyisége. A vizeletlelet húgyúti fertőzés esetén mindig kóros. A kórokozó mikrobiológiai vizsgálattal kitenyészthető a vizeletből, ekkor az antibiotikum érzékenységét is meghatározzák.



Azonnal gyermek sürgősségi osztály felkeresése szükséges

3 hónapnál fiatalabb lázas csecsemő bűzös vizelette

Görcsös, deréktáji fájdalom, hányás, véres vizelet esetén

Ha normális folyadékfogyasztás mellett hosszú ideig nincs vizeletürítés és a gyermek alhasi fájdalmat panaszol (akut vizeletelakadás)

Ha a gyermek órák óta nem vizelet és arca, lábai duzzadtak vagy nőtt a súlya és nehezen veszi a levegőt, ebben az esetben akár mentő hívása